




La croissance de l'herbe plafonne. Les fauches s'accélèrent

Croissance des prairies

Depuis 3 semaines, la croissance de l'herbe dans la région se maintient autour des 50 Kg de MS/Ha, avec toutefois de fortes disparités entre régions agricoles ; En Indre et Loire la pousse des 3 dernières semaines varie de 27 Kg (prairies temporaires pâturées tout l'hiver à 62 Kg (prairies destinées à la fauche). La carte des croissances des prairies vous est donc d'autant plus utile pour apprécier la croissance de l'herbe la plus proche de chez vous.

Evolution des températures

Les températures nocturnes très basses, présentes et à venir, vont impacter négativement la pousse de l'herbe des jours à venir et ainsi réduire le stock d'herbe sur pied et donc le nombre de Jours d'Avance.



Cumuls de température au 21/04/2024, base 0 au 1er février, Météo France

Flashez le QRCode ci-contre pour accéder à la carte des croissances des prairies !



Tableau : Statut des parcelles du réseau régional de mesure de la Hauteur d'Herbe

Semaine du :	lun 25-mars	lun 01-avr	lun 08-avr	lun 15-avr
% de parcelles exploitées entre les 2 derniers passages	13%	24%	27%	36%
% de parcelles à plus de 15 cm de Hauteur Herbomètre	7%	21%	27%	29%

L'augmentation du nombre de parcelles exploitées s'est étalée sur les 4 dernières semaines.

Comme le montre le tableau ci-dessus, le nombre de parcelles exploitées (pâturées ou fauchées) est passé de 13 à seulement 36 % entre la semaine du 25 mars à celle du 15 avril (d'après notre réseau de parcelles mesurées). Sur les 2/3 des parcelles du réseau, le 1er cycle de pâturage n'a pas pu avoir lieu suite à l'absence de portance. Aujourd'hui, beaucoup de petites régions agricoles ont dépassé le repère des 750°Cj. C'est pourquoi sur les trois dernières semaines, le nombre de parcelles à plus de 15 cm de hauteur d'herbe « herbomètre », hauteur seuil pour basculer de l'exploitation par pâturage à l'exploitation par fauche est monté de 7 à 29 %.

Quand les animaux pâturent un paddock épié, en plus du refus et du gaspillage, la fauche des refus sera inévitable. La repousse se fera attendre avec comme conséquence un manque d'herbe probable pour le deuxième cycle de pâturage. C'est pourquoi, compte tenu des stades végétatifs avancés des prairies, et de l'absence de pluie cette semaine, vous êtes nombreux à débrayer beaucoup de parcelles initialement vouées à être pâturées. Pour définir la surface à faucher, chiffrer vos Jours d'Avance de pâturage ajuster le résultat à la croissance actuelle de l'herbe (en moyenne 50 Kg de MS/j/Ha soit la consommation journalière de 3 bovins adulte) et identifier le stade physiologique des graminées de vos paddocks. **N'hésitez pas à contacter votre conseiller Fourrages pour vous accompagner dans votre calcul.**

$$\text{Nombre de Jours d'avance} = \frac{(\text{Hauteur d'herbe} - 5 \text{ Cm}) \times \text{densité} \times \text{surface}}{\text{Besoins journaliers du lot d'animaux}}$$

Les premières fauches de méteil ont débuté

La récolte précoce de méteil permet d'en maximiser la valeur alimentaire. Si vous privilégiez le rendement attendez encore. **Pour plus de précisions, téléchargez la note technique**

<https://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/interculture-mcpi>

Quelques rappels pour limiter la perte de valeur entre la fauche et la distribution du fourrage :

- minimum deux jours de préfanage pour atteindre 32-35 % de MS;
- Surveiller la finesse de hachage des brins;
- incorporer un conservateur pour les méteils riches en légumineuses.



25/04 : Journée technique pâturage Sicarev - 10h à 15h à AINAY LE CHÂTEAU (18)

29/04 : Rendez-vous à la bergerie - 14h à 16h au GAEC du Pont, JARS (18)

14/05 : Tech&Bio Élevages et cultures - Journée consacrée à la polyculture élevage et à la complémentarité entre élevages et cultures (ateliers, conférences, démonstrations...) à Tours-Fondettes Agrocampus (37)